

Contrôle des endoparasites chez les poules pondeuses

Moins de résistances lors de l'utilisation sélective des vermifuges


Le risque d'infestation par des vers gastro-intestinaux est plus élevé dans les troupeaux qui bénéficient d'un accès à l'extérieur. Dans les poulaillers, l'utilisation sélective de vermifuges basée sur les résultats d'analyses des fientes, réduit le risque de formation de résistance chez les vers, réduit le risque de résidus dans les œufs et minimise l'impact négatif sur les organismes du sol et de l'eau.



Les poules pondeuses sont infestées par divers endoparasites, les rendant ainsi sensibles à d'autres mala-

dies. Les poules infestées réagissent souvent par une baisse des performances et une hausse de la mortalité.

Les endoparasites les plus importants chez les poules pondeuses

	Ascarides (<i>Ascaridia galli</i>)	Vers caecale (<i>Heterakis gallinarum</i>)	Capillaires (<i>Capillaria</i> spp.)	Cestodes ou vers plats (div. espèces)
Couleur	jaunâtre-blanc	jaunâtre-blanc	transparent	jaunâtre-blanc
Apparence	Ø env. 3 mm	fine	en forme de cheveux	structurée
Longueur	< 100 mm	< 20 mm	< 20 mm	hétérogène
				
Hôte intermédiaire	sans hôte intermédiaire	sans hôte intermédiaire	selon l'espèce: sans hôte intermédiaire ou vers de terre	toujours avec hôte intermédiaire (escargots, insectes)
Prépatence*	5-10 semaines	3-5 semaines	3-4 semaines	2-3 semaines
Colonisation	intestin grêle	appendices	tout tractus intestinal	intestin grêle
Symptômes	<ul style="list-style-type: none"> consommation ↓ diarrhée émaciation production ↓ jaune d'œuf pâle occlusion intestinale 	<ul style="list-style-type: none"> consommation ↓ diarrhée perte de poids lors d'une infestation massive 	<ul style="list-style-type: none"> diarrhée perte de poids production ↓ 	<ul style="list-style-type: none"> peu de symptômes
Autres aspects	<ul style="list-style-type: none"> les femelles pondent bcp. d'œufs les œufs survivent longtemps dans l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> vers de terre en tant qu'hôtes de base porteur de la maladie des points noirs 		

Règlement de Bio Suisse sur les vermifuges :

- Utiliser des vermifuges seulement après la preuve d'une infection traitable basée sur l'analyse des fientes ou sur ordonnance d'un vétérinaire.
- Libre choix des médicaments parmi les médicaments approuvés par Swissmedic pour les poules pondeuses
- Pas de doublement du délai d'attente

* Période entre le moment où la poule absorbe les œufs de vers et la ré-excrétion d'œufs