

Formulaire de commande d'analyses de fourrage

Instructions pour le prélèvement et l'envoi de l'échantillon

- **Pâturage:** prélever à au moins trois endroits répartis en diagonale sur le pâturage. Couper entièrement des carrés de 50 × 50 cm sur 5 cm de hauteur et tenir compte de TOUTES les plantes. Quantité d'échantillons: de 1 à 2 kg.
- **Front de prélèvement du silo:** prélever des échantillons à au moins trois endroits représentatifs. Quantité d'échantillons: de 0,5 à 1 kg.
- **Stock de foin:** veuillez décider quelle coupe vous souhaitez échantillonner. Un échantillon moyen n'a souvent que peu de sens. Prélever chaque échantillon à trois endroits représentatifs. Quantité d'échantillons: de 200 à 500 g.
- **Fourrage / ensilage / foin engrangé sur la table d'alimentation:** prélever des échantillons répartis en au moins trois endroits représentatifs. Les quantités d'échantillons dépendent du type d'aliment: Voir ci-dessus.
- Emballer l'échantillon dans un sac en plastique propre, l'étiqueter le nom et le contenu de l'échantillon de manière imperméable et l'envoyer avec le présent formulaire complété au:
FiBL, Labor Nutztierwissenschaften, Ackerstrasse 113, 5070 Frick

Pour la transmission des résultats d'analyse, veuillez indiquer l'adresse et les informations sur le type d'aliment:

Nom _____
 Prénom _____
 Rue _____
 NPA/Lieu _____
 E-mail _____

Date / Signature

Type de fourrage

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fourrage vert | <input type="checkbox"/> Ensilage d'herbe |
| <input type="checkbox"/> Fourrage sec | <input type="checkbox"/> Ensilage de maïs |
| <input type="checkbox"/> Autres _____ | <input type="checkbox"/> Autres ensilages _____ |

Informations sur les échantillons

- | | |
|--|--|
| Stade de croissance | Stade de maturité
(pour le maïs) |
| <input type="checkbox"/> 3 Début épiaison | <input type="checkbox"/> Floraison |
| <input type="checkbox"/> 4 Pleine épiaison | <input type="checkbox"/> Laiteux |
| <input type="checkbox"/> 5 Fin épiaison | <input type="checkbox"/> Début du stade pâteux |
| <input type="checkbox"/> 6 Floraison | <input type="checkbox"/> Stade pâteux |
| <input type="checkbox"/> Autres _____ | |

Coupe / stade de croissance _____

Lieu de récolte _____

Date de récolte _____

Mesure du pH des silos (+ CHF 20.00)

Végétation

Fourrage de prairie

- | | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> G | Riche en graminées, autres graminées |
| <input type="checkbox"/> GR | Riche en graminées, principalement ray-grass |
| <input type="checkbox"/> A | Équilibré, autres graminées |
| <input type="checkbox"/> AR | Équilibré, principalement des ray-grass |
| <input type="checkbox"/> L | Riche en légumineuses |
| <input type="checkbox"/> KF | Riche en herbes (autres herbes à feuilles fines) |
| <input type="checkbox"/> KG | Riche en herbes (autres herbes à grosses tiges) |
| <input type="checkbox"/> U | Végétation inconnue |
| <input type="checkbox"/> Autres | _____ |

Remarques