

Pruneaux, Mirabelles

2019

Variétés recommandées pour l'agriculture biologique

Variétés (gras = variétés principales en bio)	Sensibilités		Caractéristiques agronomiques				Caractéristiques des fruits				Remarques	
	Monilia	Sharka	Rendement	Vi-gueur	Date floraison	Pollinisateurs possibles	Arome	Gros-seur	Fer-meté	Jutosité		
Précoces												
Katinka (S)	•••	••••	••	••••	M	Elena *	•••	••	••	••	Sensible à pseudomonas, tendance dénudement et surcharge, bonne séparation noyau	
Tegera (S)	•••••	•	••••	•••••	MP	Katinka *	••••	••	••	••	Très bonne séparation du noyau → jeunes arbres: Laisser croître de longues pousses	
Vanette	••		•••	•••	MP	Tegera, Jojo, Dabrovice *	•••	•••	•••	••••	Tendance au dénudement → taille courte, récolter avec les pédoncules	
Moyennes												
Dabrovice	•••••	••	•••	•••	P	Jojo	••••	•••	•••	•••	Très robuste, bonne ramif., bois à fruit court, très bonne sép. noyau → peu éclaircir	
Fellenberg Grässli	•••	•	•••	•••	T	**	•••••	••	•••		Sensible à la flétrissure et aux rouilles → éclaircissage pas toujours nécessaire	
Blue Frost ®	••••	••••	••••	•••	P	Katinka *	•••••	••••	••••	••••	Récolte étalée dans le temps, partiellement autofertile	
Topking	••	•••	•••••	•••	MT	C. Fruchtbare, Tegera, Jojo *	••••	••	••••	•••	Sensible à l'éclatement, arôme rapidement passé, bonne séparation du noyau → cueillette du sommet des couronnes	
Mirabelle de Nancy	•••	••••	•••••	••••	MT	**	••••	•	••	•••	Fruits jaune-orange, sensible à l'alternance	
Cacaks Fruchtbare	•••	•	••••	••	M	Katinka **	••••	••	••••	•••	Sensible à pseudomonas, bonne ramif. charge et sép. noyau → forte taille du bois à fruit	
Tardives												
Fellenberg FAW	•••	•	••••	•••	T	**	•••••	••	•••	•••	Sensible au flétrissement, bonne ramification, charge, conservation et séparation noyau → éclaircissage pas toujours nécessaire, pour sols chauds et lourds	
Jofela ®	••••	•••••	••••	••••	MP	**	••••	•••	•••	•••	Hypersensible, récolte très étalée → cueillette du sommet des couronnes	
Jojo (S)	••••	•••••	••••	•••	MP	Tegera, Dabrovice *	•••	••••	•••	•••	Hypersensible, sensible aux pseudomonas, croissance peu dense, très bonne séparation du noyau → seulement dans les sites et pas trop humides	
Tophit Plus (S)	••••	•••	••••	••••	MT	C. Fruchtbare, Elena *	••••	•••••	••••	••••	Très robuste, pas de flétrissure, pas sensible à l'éclatement, récolte facile, bonne ramification, très bonne séparation du noyau, très bonne conservation	
Elena	••••	••••	•••••	•••••	M	**	••	••	••••	••••	Sensible à la flétrissure et à l'éclatement, noyau ±, conservation OK → éclaircir tôt	